



Soluciones a base de ácaros depredadores

Koppert

Ácaro depredador	Plaga objetivo	Efectiva a	Productos
 <i>Amblydromalus limonicus</i>	Trips: primero y segundo estadio larvario de varias especies de trips Mosca blanca: huevos y larvas	13 - 27 °C	 Limonica
 <i>Amblyseius swirskii</i>	Trips: primero y segundo estadio larvario de varias especies de trips Mosca blanca: huevos y larvas Varias especies de ácaros pequeños	15 - 32 °C	 Swirski-Mite  Swirski-Mite Plus  Swirski-Mite LD  Swirski Ulti-Mite
 <i>Neoseiulus cucumeris</i>	Trips: primer estadio larvario de varias especies de trips	15 - 25 °C	 Thripex  Thripex Plus
 <i>Phytoseiulus persimilis</i>	Araña roja o ácaro de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>) y otras <i>Tetranychus</i> spp., excepto <i>Tetranychus evansi</i>	15 - 30 °C	 Spidex  Spidex Vital  Spidex Vital Plus  Spidex Boost
 <i>Neoseiulus californicus</i>	Araña roja o ácaro de dos manchas (<i>Tetranychus urticae</i>); araña roja de los frutales (<i>Panonychus ulmi</i>); araña roja de los cítricos (<i>Panonychus citri</i>); otras especies de araña roja y varias especies de ácaros pequeños	13 - 32 °C	 Spical  Spical-Plus  Spical Ulti-Mite

koppert.mx

original