


# Ficha técnica

# Horiver Wetstick

## Trampa con pegamento húmedo

- Para capturar y monitorear distintos insectos voladores
- Con una cuadrícula que facilita el conteo (10x25 cm)
- Con aditamentos para una colocación rápida y cómoda



## Objetivo

### Plagas

- Horiver amarilla: trips, mosca blanca, psílido, pulgón, moscas esciáridas, minador, chicharritas.
- Horiver azul: trips, moscas esciáridas y minadores.
- Horiver blanca: Adultos de piojo harinoso y *Lygus sp.*
- Horiver rojo: Mosca del vinagre, *Drosophila sp.*
- Horiver verde: *Echinothrips americanus*, chicharritas, trips, moscas esciáridas.
- Horiver negro: Lepidópteros.

## Especificaciones de producto

### Producto

Trampas con pegamento amarillas, azules y blancas.

### Colores y medidas disponibles

- Amarilla: 10 cm x 25 cm; 40 x 25 cm.
- Azul: 10 cm x 25 cm; 40 x 25 cm.
- Blanca: 10 cm x 25 cm; 40 x 25 cm.
- Verde: 10 cm x 25 cm; 40 x 25 cm.
- Rojo: 10 cm x 25 cm; 20 x 25 cm.
- Negro: 40 cm x 25 cm.

### Cantidad por paquete

- 10 cm x 25 cm: 10 piezas
- 40 cm x 25 cm: 12 piezas
- 20 cm x 25 cm: 22 piezas

# Koppert

## Uso

- En cultivos altos tales como pepino, tomate y pimiento, las trampas deben colocarse justo por encima de la planta e ir las subiendo según crezca el cultivo.
- En cultivos como la vid se deberán sujetar de los tutores a la mitad del tallo del cultivo.
- Cuando se use contra minadores, colocar las trampas horizontalmente en los pasillos.
- En cultivos con poca cobertura vegetal, las trampas se deberán sujetar con cañas o soportes de alambre a un máximo de 30 cm por encima del cultivo, para evitar demasiado movimiento por el viento.
- Las trampas deben colocarse en áreas con el mayor riesgo de ataque (puertas, extremos de la cubierta y aberturas laterales de ventilación) o de forma general si no se tienen identificados estos sitios.
- Si las trampas cuentan con un número significativo de insectos sobre ellas, estas deberán ser reemplazadas por otras nuevas.

## Dosis

Con propósitos de seguimiento, la dosis recomendada es 5 trampas por cada 1,000 m<sup>2</sup>. Cuando las trampas están destinadas a contribuir al control en puntos conflictivos (o sea, captura en masa), usar 1 trampa por cada 20 m<sup>2</sup>. Ambas trampas pueden ser utilizadas para este propósito.

Horiver	Dosis	m <sup>2</sup> / unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
Preventiva	1/200 m <sup>2</sup>	-	-	-	Propósitos de seguimiento
Curativa	1/20 m <sup>2</sup>	-	-	-	Propósitos de seguimiento

## Vida útil

De 4 a 6 semanas, dependiendo la presión de la plaga y las condiciones ambientales.

## Manejo del producto

### Almacenamiento

Consulte la fecha de caducidad.

### Temperatura de almacenamiento

0-32 °C.

### Condiciones de almacenamiento

En un lugar fresco y seco.

---

### **¡Importante!**

*Todos los complementos se venden por separado.*

*Se aplican las condiciones generales de Koppert (Koppert B.V. y/o sus empresas afiliadas).*

*Solo se deben usar productos autorizados en su país o estado y cultivo. Consulte los requisitos de registro locales.*

*Koppert no se responsabiliza del uso no autorizado del producto.*

*Koppert no se responsabiliza de la pérdida de calidad, si el producto se almacena durante más tiempo del recomendado o bajo condiciones no apropiadas.*